



Residencias Médicas


Preguntas de Examen

1. Dentro del grupo de las hiperlipemias inducidas por farmacos, se encuentran aquellas que son producidas por los anticonceptivos hormonales. En relacion a las alteraciones que estos producen sobre el metabolismo lipidico, cual de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. El efecto sobre los lipidos plasmaticos depende del tipo de progestageno
2. El efecto mas comun es un aumento de los trigliceridos
3. El efecto sobre los lipidos plasmaticos no depende de la dosis de estrogenos
4. Producen un incremento de la produccion hepatica de VLDL

2. En las mujeres fumadoras es mayor la frecuencia de:

1. Aborto espontaneo
2. Nacimientos prematuros
3. Niños de bajo peso al nacer
4. Todas las anteriores



Residencias Médicas

Preguntas de Examen

3. La coagulacion intravascular diseminada se asocia mas frecuentemente a la leucemia:

1. Promielocitica aguda
2. Monocitica aguda
3. Mielocitica aguda
4. Megacariocitica aguda

4. Se considera diagnostico de diabetes cuando luego de dos tomas de glucemia en ayunas, los valores son:

1. Igual o mayor a 116 mg por ciento
2. Igual o mayor a 126 mg por ciento
3. Igual o mayor a 140 mg por ciento
4. Igual o mayor a 200 mg por ciento

5. Las bacterias causales mas frecuentes de neumonia del adulto adquirida en la comunidad son:

1. S. Pneumoniae y S. Aureus
2. Micoplasma pneumoniae y S. Pneumoniae
3. S. Pneumoniae y H. Influenzae
4. S. Pneumoniae y C. Trachomatis


6. Un varón no fumador de 28 años presenta síntomas de disnea intermitente. Los resultados de las pruebas de la función pulmonar se muestran en los datos siguientes: prueba CVF valor actual 2,43 L porcentaje de lo esperado 84 por ciento, prueba

VEF1 valor actual 1,93 L porcentaje de lo esperado 73 %, relación VEF1 / CVF valor actual 75 %, FEM 50 valor actual 1,85, porcentaje de lo esperado 59 %, cuál de las siguientes medicaciones es la más indicada para iniciar el tratamiento?

1. Ipratropio
2. Corticoesteroides inhalados
3. Tabletas de albuterol oral
4. Antihistamínicos

7. Un varón de 42 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 durante los últimos 18 años, se mantiene con insulina. La presión arterial es de 142 – 95 mmHg y el pulso de 82 por minuto, regular. En el examen de fondo de ojo se encuentran microaneurismas, exudados suaves y duros y hemorragias pequeñas. Las pruebas iniciales de laboratorio muestran glucosa plasmática (2 hs después de comer); 240 mg/dl, hemoglobina A1C 14,2 por ciento, creatinina 1,8 mg/dl albumina sérica: 3,7 g/100 ml y proteína en orina de 24 horas: 3,19 gramos.Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?

1. Es muy probable que el paciente desarrolle nefropatía terminal al cabo de 10 años
2. Es muy posible que su concentración sérica de renina sea alta
3. Deber efectuarse biopsia renal
4. El paciente habría desarrollado nefropatía a una edad más temprana si hubiera sufrido diabetes mellitus tipo 2



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

8. En relación al cuadro clínico en el momento del diagnóstico de una leucemia aguda linfoblástica en el adulto, señale la afirmación incorrecta:

1. Puede ser hallazgo causal al practicar una analítica por cualquier motivo
2. La infiltración del sistema nervioso central es muy frecuente, alrededor del 40 por ciento en algunas series
3. Se detecta fiebre en el 50 por ciento de los casos
4. Un tercio de los enfermos presentan dolores osteoarticulares

9. Recién nacido, de 7 días de vida, con examen clínico normal, la madre refiere que el niño duerme todo el día. Excepto para mamar, cosa que hace 7 veces al día. Peso nacimiento: 3350 gramos. Peso actual: 3250 gramos. La conducta más adecuada es:

1. Indicar fórmula como complemento
2. Continuar con la lactancia materna, tranquilizando a la familia
3. Suspender la lactancia materna y alimentarlo con leche maternizada
4. Indicar como complementario leche entera en polvo diluida al medio

10. Cuales son los valores en un espermograma normal?

1. Volumen mayor a 2 ml y concentracion espermatica mayor a 20 millones / ml
2. Movilidad entre 5 y 10 por ciento
3. PH 5,2 a 7,2
4. Morfologia espermatica normal 90 por ciento

11. Las manifestaciones paraneoplasicas se asocian mas frecuentemente al:

1. Carcinoma epidermoide de pulmon
2. Adenocarcinoma pulmonar
3. Carcinoma de celulas grandes de pulmon
4. Carcinoma pulmonar de celulas pequeñas

12. Complicaciones mas frecuentemente de la varicela es:

1. Ataxia
2. Meningoencefalitis
3. Neumgnitis
4. Infeccion de piel y partes blandas

13. P.F. mujer de 40 años, consulta por disnea de esfuerzo, en el examen cardio vascular se detecta choque de punta amplio ubicado en sexto espacio intercostal, 2 cm por fuera de la linea hemiclavicular, soplo aspirativo, in crescendo portomesodiastolico en tercer espacio intercostal izquierdo paraesternal, soplo sitolico rombuidal en segundo espacio intercostal paraesternal. Derecho y en la punta, luego del segundo ruido, se ausculta con la campana un ruido grave, el pulso es cele, regular, 90 por minuto. La presion arterial es de 170 ? 50 mm hg. Marque el enunciado correcto.

1. La presencia de una estenosis aortica explica todos los hallazgos
2. Tiene un desdoblamiento del segundo ruido
3. Tiene seguramente un tercer ruido
4. Tiene hipertension arterial esencial

14. Una mujer de 74 años se queja de exacerbacion de un dolor en la rodilla izquierda al apoyar peso y al caminar. El examen de la rodilla revela un derrame pequeño, sin crecimiento oseo, temperatura conservada y crepitacion a la flexion y extension de la rodilla. Se lleva a cabo una artrocentesis diagnostica. Cabe esperar que el liquido sinovial presente todas las caracteristicas siguientes, excepto:

1. Color amarillo palido
2. Buena viscosidad
3. Cuenta leucocitaria de 800/mm cubicos
4. Glucosa de 22 miligramos por decilitro

15. Cual es la forma de administracion de oxigeno que ofrece mayor seguridad para el tratamiento

de la insuficiencia respiratoria aguda del paciente con epoc?


1. Mascarilla de flujo alto con FIO2 predeterminada y sostenida
2. Lentillas nasales
3. Canulas nasales
4. Mascarillas simples con reservorio

16. Paciente de 4 años de edad, con buen estado general, que presenta dolor abdominal de tipo colico, con deposiciones de consistencia normal, con sangre rutilante y coagulos. El diagnostico mas probable es:

1. Síndrome de Schonlein – Henoch
2. Diverticulo de Meckel
3. Colitis ulcerosa
4. Enfermedad de Crohn

17. Un varon de 2 meses presenta tumefaccion en la zona inguinal derecha. No ha tenido fiebre, pero ha estado irritable y ha vomitado con frecuencia. El examen fisico revela una masa firme fija en el anillo inguinal externo, dolorosa a la palpacion. Cual es el diagnostico mas probable?

1. Epidermitis aguda
2. Hidrocele agudo
3. Hernia inguinal atascada
4. Linfadenitis inguinal



Residencias Médicas

18. La droga de primera eleccion en el tratamiento de una neumopatia por nocardia es:

1. Ciprofloxacina
2. Trimetroprima – sulfametoxazol
3. Eritromicina
4. Doxiciclina

19. Cual es el denominador de la tasa de mortalidad materna?

1. Mujeres de 15 y 49 años
2. Nacidos vivos
3. Total de la poblacion
4. Total de la poblacion femenina

21. En una mujer de 25 años se encontro anemia. Hay antecedentes familiares positivos de calculos biliares a edad temprana en muchos miembros de la familia. Esta combinacion sugiere el diagnostico de:

1. Deficiencia de vitamina B12
2. Riesgo de talasemia alfa
3. Deficiencia de hierro
4. Esferocitosis hereditaria

22. Un paciente de sexo masculino de 53 años de edad presenta un cancer de colon. Indique cual de las siguientes conductas es correcta para su estadificacion preterapeutica:

1. Realizar una resonancia magnetica
2. Realizar una fibrocolonoscopia
3. Realizar una tomografia computada abdomino pelviana con contraste
4. Realizar una ecografia abdominal

23. Un niño de 14 años es traído a consulta a un servicio de emergencias en estado de coma superficial. En la ultima semana presento vomitos y dolor abdominal. En el examen fisico se comprueba deshidratacion aguda severa y respiracion tipo acidotica. El diagnostico mas probable es:

1. Meningoencefalitis
2. Sepsis a punto de partida abdominal
3. Cetoacidosis diabetica
4. Coma uremico

24. Un lactante de 2 semanas tiene taquicardia, taquipnea y deficiente aumento de peso. Los hallazgos son: radiografia de torax: cardiomegalia; ecocardiografia: corazon estructuralmente normal, dilatacion ventricular izquierda, fraccion de eyeccion de 20 por ciento (normal mayor del 55 por ciento), pequeño derrame pericardico y regurgitacion mitral y tricuspidea leve. Gases en sangre arterial: PH 7,30; PO2 72 TORR; PCO2: 41 Torr. La medida terapeutica inicial mas apropiada es la administracion endovenosa de:

Preguntas de Examen

1. Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina
2. Digoxina
3. Adrenalina
4. Furosemida

25. En el tratamiento de la tuberculosis, la hiperuricemia puede deberse a:

1. La isoniacida
2. La estreptomycin
3. La rifampicina
4. La piracinamida

26. Por que se divide la tasa de mortalidad infantil en neonatal y post neonatal?

1. Para compararlas
2. Para diferenciarlas
3. Para analizar causales
4. Ninguna de las anteriores

27. Una placa blanquecina en ambos carrillos en un paciente, de 35 años, con habitos etilicos y

tabaquicos; de disposicion extendida y con bordes arborescentes como pequeños helechos; ademas de una leucoplasia; con que otra lesion de las siguientes se podria asimilar?:

1. Un liquen rojo plano
2. Una placa opalina de una s filis secundaria
3. Una candidiasis oral
4. Una "mucosa mordisqueada"

28. En el paciente con anemia cronica de desarrollo lento ocasionada por perdida oculta de sangre, con un hematocrito de 19 %, los mecanismos compensadores comprenden todos los siguientes, excepto:

1. Disminucion del acido 2 – 3 difosfoglicerico de los eritrocitos
2. Aumento del gasto cardiaco
3. Disminucion de la resistencia vascular periferica
4. Aumento en la produccion de eritropoyetina

29. Cual de los siguientes enunciados respecto de la sifilis es falso?

1. El diagnostico se confirmacion el hallazgo del treponema pallidum en la lesion o en el ganglio satelite
2. La transmision puede ser sexual, placentaria o por transfusion de sangre
3. La FTA ABS se hace reactiva al mes de la aparicion del chancro
4. Durante el ultimo mes de embarazo la sifilis se trata con penicilina G sodica

30. En la clasificacion de la artritis de takayasu, no es verdad que: **le Examen**

1. En el tipo IV se afectan las arterias pulmonares
2. En el tipo III se afectan el arco aortico y la aorta toracoabdominal
3. En el tipo II se afecta la aorta toracoabdominal
4. En el tipo V se afectan las arterias pulmonares, la aorta ascendente, el arco aortico y sus ramas

31. Una niña de 4 años con sintomas de tipo gripales de 2 dias de evolucion, tiene diarrea, fiebre de 38 grados centigrados y anorexia leve. Asiste a una guarderia. Los exámenes de laboratorio muestran una bilirrubina total de 1,6 mg/dl y un nivel de alanina aminotransferasa (ALT) de 651 u/l. Cual es el estudio diagnostico mas apropiado?

1. Antigeno de hepatitis A en materia fecal
2. Antigeno de superficie de hepatitis B en el suero
3. Inmunoglobulina (IG) G para hepatitis B en el suero
4. IGM para hepatitis A en el suero

32. La migracion espermatica debe evaluarse en:

1. El postmenstruo inmediato
2. Fase lutea
3. Periodo preovulatorio, muy proximo a la ovulacion

4. En cualquier etapa del ciclo

33. La atención primaria de la salud (APS), paradigma sanitario puesto en marcha en 1978 en Alma Ata por la OMS y la UNICEF, es un:


1. Programa de asistencia sanitaria
2. Estrategia global de acción sociosanitaria
3. Plan de salud para los sectores poblacionales más pobres
4. Conjunto de actividades curativas a nivel comunitario en el primer nivel de atención

34. Frente a una mucosa bucal con vegetaciones de aspecto moriforme que deforma el labio y las encías, produciendo dolor, a qué infección inclinarse para el diagnóstico?

1. Una cromomycosis
2. Una aspergilosis
3. Una epiteliomatosis espinocelular aguda
4. Una paracoccidiodomycosis

35. Una mujer de 78 años de edad es valorada en el servicio de urgencias por antecedentes de vómitos, calambres y fiebre de 4 días de evolución. No ha podido ingerir alimentos y solo ha bebido té, agua y bebidas carbonatadas. Los antecedentes no revelan información de interés. ¿Cuál de los siguientes sería el trastorno electrolítico probable?

1. Hiponatremia



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

45. En el examen de un niño de 12 años, usted comprueba que su peso sobrepasa ampliamente el percentil 97 para la edad cronológica, mientras que su estatura está en el percentil 50. Los genitales aparentan ser pequeños cuando el niño se para erguido.

El diagnóstico más probable es:

1. Hipotiroidismo
2. Hipogonadismo
3. Hipopituitarismo
4. Obesidad exógena

46. Una hemorragia genital de origen vulvovaginal durante la infancia generalmente se relaciona con:

1. Procesos traumáticos
2. Leucoqueratosis vulvar
3. Sarcoma vulvar
4. Condiloma vulvovaginal

47. El síndrome de Wolf Parkinson White se caracteriza por presentar:


1. PR corto con onda delta y ensanchamiento del QRS
2. PR corto con onda delta y QRS angosto
3. PR largo con onda delta y QRS angosto
4. PR largo con onda delta y ensanchamiento del QRS

48. Un varón de 60 años con nutrición adecuada se presenta a consulta por disfagia leve progresiva. Aunque se a la que percibe gorgoteo durante la deglución, a veces regurgita alimentos no digeridos cuando está acostado. Los estudios de motilidad esofágica arrojan resultados anormales. Lo más probable es que la papilla de bario indique:

1. Divertículo epifrénico
2. Divertículo por tracción del tercio medio del esófago
3. Divertículo faringoesofágico
4. Estrechez esofágica

49. Una mujer de 28 años de edad con seropositividad a HIV acude al servicio de urgencias con disnea y PO₂ de 65 mmHg. Un perfil químico muestra una deshidrogenasa láctica en suero de 1000. ¿Cuál es la causa más probable de las molestias respiratorias de la paciente?

1. Proteinosis alveolar pulmonar
2. Embolia pulmonar
3. Neumonía por *pneumocystis carinii*
4. Tuberculosis pulmonar



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

50. Ante un hombre de 60 años con epigastralgia, ictericia y pérdida de peso, ¿cuál de los siguientes exámenes indica para comenzar con su evaluación imagenológica, para arribar al diagnóstico?

1. Ecografía de abdomen
2. Colon por edema de doble contraste
3. Radiografía simple de abdomen de pie y acostado
4. Fibroendoscopia gastroduodenal

1 - 3	21 - 4	
2 - 4	22 - 4	
3 - 1	23 - 3	
4 - 2	24 - 2	
5 - 2	25 - 4	
6 - 3	26 - 3	41 - 2
7 - 3	27 - 1	42 - 4
8 - 3	28 - 1	43 - 1
9 - 2	29 - 3	44 - 2
10 - 1	30 - 4	45 - 4
11 - 4	31 - 4	46 - 1
12 - 4	32 - 3	47 - 1
13 - 2	33 - 2	48 - 1
14 - 4	34 - 4	49 - 3
15 - 2	35 - 3	50 - ?
16 - 2	36 - 1	
17 - 3	37 - 4	
18 - 3	38 - 1	
19 - 2	39 - 4	
20 - 2	40 - 4	



Residencias Médicas
Preguntas de Examen