



Residencias Médicas

Preguntas de Examen

1) En un paciente portador de enfermedad de Graves Basedow, cual de los siguientes seria el orden de frecuencia de los hallazgos?

- a) Nerviosismo > perdida de peso > caida del cabello > diarrea.
- b) Perdida de peso > nerviosismo > diarrea > caida del cabello.
- c) Diarrea > perdida de peso > nerviosismo > caida del cabello.
- d) Caida del cabello > perdida de peso > diarrea > nerviosismo.

2) De los agentes causales que se enumeran, marque cual es el que mas frecuentemente puede producir enfermedad pelvica inflamatoria silente.

a) Bacteroides Fragilis.

b) Gonococo.

c) Chlamydia Trachomatis.

d) Estreptococo.



Residencias Médicas

Preguntas de Examen

3) Jorge M., de 39 años de edad, concurre a la consulta presentando una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) con los siguientes valores: Glucemia en ayuno: 116 mg/dL; a la segunda hora: 152 mg/dL. Usted interpreta que Jorge presenta:

- a) Glucemia de ayuno alterada.
- b) Diabetes.
- c) Glucemia normal.
- d) Intolerancia a la glucosa.

4) La información disponible en la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia muestra que la tasa anual de incidencia de todas las formas de tuberculosis del año 2003 en la Provincia de Buenos Aires registra variación según grupos de edad. Uno de los siguientes grupos registra la mayor tasa. Indique cuál de ellos es:

- a) 0 a 4 años.
- b) 10 a 14 años.
- c) 20 a 24 años.
- d) 30 a 34 años.

5) Si consideramos la variable "hipertensión arterial", su escala de medición será:

- a) Numérica discreta.
- b) Numérica continua.
- c) Nominal categorica.
- d) Nominal dicotomica.



Residencias Médicas

6) En el recién nacido, se considera hipoglucemia significativa a valores de glucemia menores de:

- a) 20 mg/dL.
- b) 40 mg/dL.
- c) 60 mg/dL.
- d) 80 mg/dL.

7) El Mycobacterium Tuberculosis multirresistente presenta al menos resistencia a:

- a) Isoniacida + rifampicina.
- b) Isoniacida + pirazinamida.
- c) Isoniacida + rifampicina + pirazinamida.
- d) Isoniacida + rifampicina + pirazinamida + etambutol/estreptomina.

8) Después de iniciado el tratamiento con warfarina, el efecto antitrombótico completo no se alcanza durante varios días como consecuencia de la vida media prolongada, en particular del factor:

- a) II.
- b) VII.
- c) IX.
- d) X.

9) Bajo peso al nacer se define como un recién nacido que pesa menos de:

- a) 1500 g.
- b) 2000 g.
- c) 2500 g.
- d) 3000 g.



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

10) En presencia de esteatorrea, una absorción disminuida de D-Xilosa indica:

- a) Insuficiencia pancreática exocrina.
- b) Enfermedad hepatobiliar.
- c) Enteropatía difusa.
- d) Todas son correctas.

11) El flujo poco abundante, de color blanco, de aspecto grumoso, con gran viscosidad y en forma pseudomembranosa es propio de la infección por:

- a) Gardnerella.
- b) Clamydias.
- c) Candida Albicans.
- d) Tricomonas.

12) Según la Guía para la atención integral del niño de 0 a 5 años, cuál de las siguientes situaciones constituir a una señal de alerta?

- a) El niño no se sienta a los seis meses de edad.
- b) El niño muestra indiferencia ante los seres humanos, familiares o no, a los seis meses de edad.
- c) El niño se chupa las manos a los tres meses de edad.
- d) El niño comienza a caminar a los 16 meses de edad.

13) El Plan Federal de Salud propone como logro de su sendero de reformas consolidar un:

- a) Sistema Integrado de Salud.
- b) Sistema Federal de Salud.
- c) Servicio Nacional de Salud.
- d) Seguro Nacional de Salud.



14) Constituye contraindicación para la rehidratación oral:

- a) Hipertermia de 39° C.
- b) Shock hipervolemico.
- c) Acidosis metabólica severa.
- d) Hepatitis crónica.

15) En pediatría, el "petit mal" corresponde a:

- a) Crisis de ausencia simples o tópicas.
- b) Mioclonias benignas del lactante.
- c) Convulsiones febriles.
- d) Espasmos infantiles.

16) En la consolidación viciosa de las fracturas, el término sinostosis ósea significa:


- a) Hueso cabalgado y acortado.
- b) Angulación diafisaria.
- c) Unión ósea patológica.
- d) Seudoartrosis hipertrofica.

17) La ecografía es más útil en el abdomen agudo producido por:

- a) Obstrucción intestinal.
- b) Absceso subfrenico.
- c) Patología biliar aguda.
- d) Apendicitis aguda.

18) En pacientes adultos con asma moderada, el tratamiento de primera elección consiste en la administración de:

- a) Betamiméticos de acción corta.
- b) Betamiméticos de acción prolongada.
- c) Glucocorticoides inhalados.
- d) Teofilina por vía oral.



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

19) De los siguientes estudios por imágenes, cuál ofrece mayor especificidad en la pielonefritis aguda?

- a) Urográfico excretor.
- b) Ecografía.
- c) Renografía isotópica.
- d) Tomografía computada.

20) Cual de las siguientes determinaciones hormonales caracterizan a una amenorrea de causa ovarica?

- a) FSH alta.
- b) FSH baja.
- c) LH alta.
- d) FSH baja y estrogenos bajos.

21) La vacunacion es considerada como una intervencion de:

- a) Prevencion primaria.
- b) Prevencion secundaria.
- c) Proteccion especifica.
- d) A y c son correctas.

22) Segun Mario Testa, la ideologia sanitaria biologicista considera que los problemas de salud estan condicionados por:

- a) El conflicto social general.
- b) Una deficiente atencion medica.
- c) Situaciones individuales que se apartan de la normalidad biologica.
- d) Adversidades del ambiente que rompen el equilibrio natural.

23) El sindrome de mala absorcion (SMA) en un niño de tres años presenta una de las siguientes características:

- a) Prolapso.
- b) Queilitis.
- c) Lengua despapilada.
- d) Anemia.

24) La muerte subita del lactante tiene como factor de riesgo:

- a) Hijo de madre diabetica.
- b) Posicion decubito prono para dormir.
- c) Cardiopatia congenita cianotica.
- d) Sindrome de West.

25) La apraxia es la que el paciente tiene una representacion mental correcta de los movimientos a efectuar para desarrollar una accion, pero no puede realizarse, se denomina:

- a) Ideomotora.
- b) Constructiva.
- c) Ideatoria.
- d) Callosa.

26) ----



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

27) La presentacion clinica del mieloma plantea el siguiente orden de frecuencia de hallazgos:

- a) Anemia > dolores oseos > infeccion.
- b) Dolores oseos > anemia > infeccion.
- c) Infeccion > anemia > dolores oseos.
- d) Anemia > infeccion > dolores oseos.

28) Si una paciente consulta por flujo genital con exacerbacion posmenstrual y en la especuloscopia se observa una mucosa vaginal enrojecida y colpitis maculosa o a puntos rojos, usted piensa que el agente productor es:

- a) Gonococo.
- b) Candida Albicans.
- c) Trichomona.

d) Estreptococo Hemolitico.

29) Ante un caso sospechoso de sarampion, usted debe iniciar acciones de bloqueo en todo contacto que no acredite certificado de vacunacion completo, aplicando vacuna:

a) Doble viral a todo contacto mayor de un año y sin limite de edad.

b) Triple viral a todo contacto mayor de seis meses y sin limite de edad.

c) Doble viral a todo contacto mayor de un año y menor de cinco años de edad.

d) Triple viral a todo contacto mayor de seis meses y menor de cinco años de edad.

30) Sobre los elementos conceptuales que caracterizan a la APS, marque el enunciado incorrecto:

a) Considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial.

b) Considera la atencion de las personas en el centro de salud, pero no en el hospital.

c) Interrelaciona la promocion, la prevencion, el tratamiento, la rehabilitacion y la reinsercion social.

d) Proporciona atencion de los problemas de salud individuales y colectivos.



31) Cual de las siguientes características corresponde a un estudio descriptivo?

a) Permite el estudio de la asociacion entre variables.

b) No utiliza grupos de comparacion.

c) Requiere de consecuencias observacionales de la hipotesis.

d) El investigador interviene en el fenomeno.

32) En un niño, el tratamiento recomendado de la ascariasis gastrointestinal no complicada es:

a) Albendazol 400 mg, dosis unica.

b) Furazolidona 15 mg/d a, 3 dias.

c) Tiabendazol 5 mg/kg, dosis unica.

d) Praziquantel 10 mg/kg, dosis unica.

33) Los recién nacidos prematuros reciben la vacuna de la hepatitis B dentro de las 12 primeras horas de vida y continúan uno de los siguientes esquemas de vacunación:

a) 1 y 6 meses.

b) 2 y 6 meses.

c) 1,4 y 6 meses.

d) 2, 4 y 6 meses.

34) La bradipsiquia, el reflejo de presión forzada, la apraxia de la marcha y la afasia de expresión son componentes del síndrome del lóbulo:

a) Frontal.

b) Parietal.

c) Occipital.

d) Temporal.



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

35) La cantidad de agua total (espacio intravascular, espacio intersticial, tejidos nuevos, feto, placenta, líquido amniótico) retenida al término del embarazo es de:

a) 2000 mL.

b) 4000 mL.

c) 6000 mL.

d) 8000 mL.

36) Uno de los siguientes antibióticos no tiene resistencia primaria para el tratamiento del *Helicobacter Pylori*:

a) Claritromicina.

b) Amoxicilina.

- c) Ciprofloxacina.
- d) Metronidazol.

37) Las metrorragias o perdida de sangre continuas, sin conservacion del ciclo, son mas frecuentes en los miomas de localizacion:

- a) Submucosa.
- b) Intramural.
- c) Suberosa.
- d) Cervical.

38) El diagnostico de diabetes gestacional se realiza con cifras de glucemia a partir de:

- a) 105 mg/dL en dos oportunidades.
- b) 126 mg/dL en una oportunidad (al azar).
- c) 140 mg/dL en una oportunidad (al azar).
- d) 140 mg/dL a una hora poscarga oral.



39) Cual de las siguientes causas externas presento, en el año 2001, la mayor tasa de mortalidad en el grupo de edad entre 20 y 24 años en la Provincia de Buenos Aires?

- a) Accidentes de transito.
- b) Suicidios.
- c) Homicidios.
- d) Asfixia por inmersion.

40) La menarca se presenta en la mayoría de los casos cuando las mamas estan en estadio de Tanner:

- a) Estadio 2 (M2).
- b) Estadio 3 (M3).

c) Estadio 4 (M4).

d) Estadio 5 (M5).

41) En pediatría, la pielonefritis crónica está asociada a reflujo vesicoureteral en un:

a) 10 % de los casos.

b) 30 % de los casos.

c) 60 % de los casos.

d) 90 % de los casos.

42) En nuestro medio, a excepción del Spect, la osteomielitis es detectada de forma precoz por:

a) Radiografía no penetrante.

b) Tomografía lineal.

c) Tomografía computada.

d) Centellografía.



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

43) Dada la importancia de la relación costo-beneficio en el plan de estudio de un nódulo tiroideo, en primer término deberá realizarse:

a) Perfil hormonal (laboratorio).

b) Centellografía.

c) Ecografía.

d) Punción/aspiración con aguja fina.

44) Según las guías de diagnóstico y tratamiento de HTA de la Provincia de Buenos Aires, la hipertensión de grado I se define como:

a) Presión sistólica de 130-139 mmHg o presión diastólica de 85-89 mmHg.

b) Presión sistólica de 140-159 mmHg o presión diastólica de 90-99 mmHg.

- c) Presion sistolica de 160-179 mmHg o presion diastolica de 100-109 mmHg.
- d) Presion sistolica aislada mayor a 140 mmHg.

45) Cual de las siguientes presentaciones de colitis ulcerosa tiene mas riesgo de cancer colorrectal?

- a) Colitis extensa.
- b) Colitis izquierda.
- c) Colitis rectosigmoidea.
- d) Todas las anteriores.

46) Se denomina "histerocele de segundo grado" cuando:

- a) El utero esta descendido pero no pasa del plano de la vulva.
- b) El cuello uterino asoma a traves del introito vulvar.
- c) El fondo del utero esta por fuera del plano de la vulva.
- d) El descenso del cuello del utero no pasa el plano de la vulva, pero hay un rectocele muy importante.

47) Segun la Guia para la atencion integral del niño de 0 a 5 años, el desarrollo cognitivo, con que tiene mayor correlacion?

- a) Con la precocidad de la adquisicion de alguna postura.
- b) Con la maduracion tonica del eje corporal.
- c) Con la manipulacion y la coordinacion oculo-manual.
- d) Con la adquisicion de pautas motoras gruesas (gatear, sentarse, caminar).

48) "No se trata en este caso de una contraposicion entre los centros y los hospitales, todo lo contrario, lo que se trata es de dar una nueva funcionalidad y recentrar en la poblacion..." M.

Rovere, en su texto "Redes en Salud..." plantea seis componentes para una nueva forma de pensar la atención primaria. En la cita arriba transcrita, el autor hace referencia al siguiente componente:

- a) Gobernabilidad.
- b) Cobertura total.
- c) Solidaridad.
- d) Capacidad resolutive.

49) La complicación más frecuente en un lactante con bronquiolitis aguda es:

- a) Deshidratación.
- b) Infección bacteriana.
- c) Atelectasia.
- d) Enfisema intersticial.

50) El germen que más frecuentemente produce oftalmia neonatorum es:

- a) Chlamydia Trachomatis.
- b) Trichomona Vaginalis.
- c) Streptococo Grupo B.
- d) Herpes virus.

51) La hiperventilación neurogena central se vincula con lesiones a nivel:

- a) Supramesencefálico.
- b) Mesencefálico.
- c) Protuberancial.
- d) Bulbar.



52) En un paciente de 50 años, cual de las siguientes constituye la causa mas frecuente de tumor lateral de cuello?

- a) Adenopatía metastásica.
- b) Branquioma.
- c) Linfoma.
- d) Adenitis mononucleosica.

53) Ante un paciente que presenta anemia por sangrado crónico, cual de los siguientes parámetros confirma la ferropenia?

- a) Ferremia menor a 50 mg %.
- b) Saturación de Transferrina menor a 20 %.
- c) Ferritina menor a 12 ng/mL.
- d) Reticulocitos menor a 0,5 %.

54) En una paciente de 48 años que consulta para realizar un control genito-mamario, usted solicita una mamografía. Cual de los siguientes enunciados hacen sospechar un cáncer de mama sin manifestaciones clínicas?

- a) Imágenes homogéneas con aspecto de "copos de algodón".
- b) Microcalcificaciones irregulares y agrupadas.
- c) Aspecto de "vidrio esmerilado".
- d) Imágenes nodulares de tamaño variable contorneadas por un ribete claro.

55) Un caso de sarampión puede clasificarse como asociado a la aplicación de la vacuna, si reúne los siguientes criterios excepto uno. Señalelo:

- a) Falta de caso índice o caso secundario en la investigación de campo.
- b) Ausencia de tos u otro síntoma respiratorio en el examen físico.
- c) Muestra de sangre tomada entre 8 y 56 días positiva para sarampión.

d) El exantema comienza de 2 a 4 días después de la vacunación.

56) La APS como estrategia de organización de los servicios sanitarios hace referencia a que estos:

a) Están proyectados y coordinados para atender a toda la población.

b) Están proyectados y coordinados para atender a aquellos que tienen menos recursos.

c) Están proyectados y coordinados para atender a aquellos que demanden atención en el subsector estatal.

d) Están proyectados y coordinados para atender a aquellos que demanden atención en el primer nivel.

57) Según Mario Testa, la garantía de calidad en la atención primaria de la salud está dada por:

a) La atención del paciente de forma diferencial por médicos generalistas o especialistas.

b) La disponibilidad presupuestaria otorgada al centro de salud.

c) El desarrollo tecnológico logrado en los centros de salud.

d) La conceptualización de este modo de atención como puerta de entrada para resolver el proceso de salud-enfermedad.



58) Habitualmente el tratamiento de la miliaria consiste en:

a) Modificar las condiciones ambientales.

b) Nistatina tópica.

c) Antihistamínicos por vía oral.

d) Loción con azufre al 2 %.

59) Los lactantes de edad mayor o igual a un mes, no vacunados con BCG, recibirán la vacuna BCG una vez descartada la tuberculosis cuando:

a) Presentan serología HIV no reactiva.

b) Presentan serología HIV reactiva pero son asintomáticos.

- c) Presentan serología HIV reactiva, son asintomáticos y no tienen alteraciones inmunológicas.
- d) A y C son correctas.

60) La cefalea en salvas presenta las siguientes manifestaciones, excepto una. Señalela:

- a) Rinorrea.
- b) Inyección conjuntival.
- c) Rubor de la hemicara.
- d) Escotoma centelleante.

61) Una de las siguientes situaciones no constituye factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma epidermoide de esófago. Señalela:

- a) Acalasia.
- b) Alcoholismo/tabaquismo.
- c) Síndrome de Mallory-Weiss.
- d) Esófago de Barrett.



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

62) En una paciente embarazada con riesgo de trombosis venosa profunda y TEP, usted anticoagularía con:

- a) Heparina.
- b) Heparina y cumarínicos.
- c) Cumarínicos.
- d) Todas son correctas.

63) En una mujer posmenopáusica en la que se indica una conización de cuello uterino, indique la razón por la cual el cono debería ser bien alargado:

- a) Tamaño del cuello más largo.
- b) Mayor presencia de lesiones en la base del cono.

- c) Presencia de ectropion con metaplasia.
- d) Entropion del epitelio pavimentoso.

64) La triada clasica en la enfermedad de Basedow consiste en:

- a) Hipertiroidismo, bocio difuso y mixedema pretibial.
- b) Hipertiroidismo, oftalmopatia y mixedema pretibial.
- c) Bocio difuso, oftalmopatia y mixedema pretibial.
- d) Bocio difuso, hipertiroidismo y oftalmopatia.

65) La informacion disponible en la Sala de Situacion del Ministerio de Salud de la Provincia sobre mortalidad materna muestra que, del total de muertes registradas, corresponde a aborto:

- a) El 18.8 %.
- b) El 23.8 %.
- c) El 28.8 %.
- d) El 33.8 %.



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

66) La medida de asociacion entre un factor de riesgo y una enfermedad que resulta de la resta entre las tasas de incidencia de una poblacion expuesta y una no expuesta se denomina:

- a) Riesgo relativo.
- b) Odds ratio.
- c) Coeficiente de asociacion.
- d) Riesgo atribuible.

67) El autismo infantil comienza:

- a) Antes de los tres años de edad.
- b) Entre los tres y los seis años de edad.

- c) Entre los seis y los nueve años de edad.
- d) A partir de los nueve años de edad.

68) Los efectos adversos al componente rubeola de la vacuna doble (sarampion y rubeola) o triple viral (sarampion, rubeola y parotiditis) se presentan a los:

- a) 1-5 días.
- b) 1-7 días.
- c) 7-14 días.
- d) 7-21 días.

69) Las siguientes funciones deben ser investigadas para determinar el nivel de conciencia excepto una. Señalela:

- a) Patron respiratorio.
- b) Reflejos musculares.
- c) Respuestas verbales.
- d) Movimientos oculares.



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

70) Por medio de un estudio ultrasonico, los movimientos respiratorios fetales se visualizan por primera vez a las:

- a) 15 semanas.
- b) 20 semanas.
- c) 25 semanas.
- d) 28 semanas.

RESPUESTAS CORRECTAS 2005

- 1) A
- 2) C

3) C

4) C

5) C

6) A

7) D

8) C

9) D

10) B

11) A

12) B

13) B

14) C

15) A

16) B

17) B

18) A

19) D

20) A

21) C

22) A

23) C

24) D

25) D

26) D

27) B

28) A



29) A

30) C

31) C

32) C

33) B

34) B

35) C

36) A

37) B

38) A

39) C

40) B

41) D

42) A

43) D

44) A

45) D

46) D

47) C

48) A

49) D

50) D

51) C

52) D

53) A

54) D



55) B

56) B

57) B

58) A

59) A

60) C

61) C

62) D

63) D

64) D

65) B

66) A

67) B

68) C

69) D

70) C

