



Residencias Médicas

Preguntas de Examen

1) La dermatitis seborreica infantil se caracteriza por:

- a) No ser pruriginosa
- b) Afectar el estado general
- c) Iniciarse a partir del sexto mes de vida
- d) Presentar lesiones eritematovesiculosas

2) Maria N, de 27 años cursa embarazo de 25 semanas. En su control de salud se le solicita un examen de laboratorio, entre ellos glucemia en ayunas que arroja un valor de 110 mg/dl. En una segunda prueba de glucemia es de 108 mg/dl. Usted ante estos valores considera que la paciente presenta:

- a) Valores normales de glucemia para la edad gestacional
- b) Glucemia en ayunas alterada
- c) Diabetes gestacional
- d) Tolerancia a la glucosa alterada

3) El diagnostico del síndrome de Intestino Irritable (S.I.I.) se realiza recurriendo a:

- a) Solamente el análisis del cuadro clínico
- b) Fibrobroncoscopia
- c) Estudio del tránsito yeyuno ileal y colónico
- d) Estudio de colon por enema con doble contraste

4) La existencia de dolor acompañado de un cuadro agudo de irritación peritoneal en una paciente portadora de un mioma nos debe orientar hacia:

- a) Degeneracion maligna
- b) Mioma intraligamentario
- c) Degeneracion quistica del mioma
- d) Torsion de un mioma pediculado

5) En un paciente de edad avanzada a la que se le diagnostica recientemente hipotiroidismo, usted decide comenzar el tratamiento con levotiroxina a una de las siguientes dosis:

- a) 25 micro gramos / dia
- b) 50 micro gramos / dia
- c) 75 micro gramos / dia
- d) 100 micro gramos / dia

6) Si necesitamos conocer la relacion temporal entre un posible factor de riesgo y una enfermedad diseñaremos:

- a) Un estudio de corte transversal
- b) Un estudio de cohorte
- c) Un estudio ecologico
- d) Un estudio de serie de casos



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

7) El sulfato de magnesio se usa en la preeclampsia con el objetivo de:

- a) Descender la tension arterial
- b) Disminuir la proteinuria
- c) Disminuir los edemas
- d) Prevenir las convulsiones

8) Indique el antibiotico cuya difusion es nula en un niño con meninges inflamadas:

- a) Gentamina
- b) Penicilina G benzatinica
- c) Estreptomicina
- d) Amikacina

9) La presencia de signos de neumonia o meningitis en un recién nacido, con antecedentes maternos recientes de un cuadro febril, asociado a líquido amniótico amarronado, es sugestivo de sepsis neonatal producida por uno de los siguientes germen:

- a) Anaerobios
- b) Grupo KES
- c) Escherichia coli
- d) Listeria monocytogenes

10) El tratamiento correcto de una herida con alta contaminación es:

- a) Lavar la herida y proponer el cierre por segunda
- b) Debridar el tejido contaminado y cierre primario retardado (48-72 horas)
- c) Debridar el tejido contaminado y cierre primario
- d) Realizar cierre primario y antibióticos por vía oral

11) Según las Guías Rápidas para el Primer Nivel de Atención del Programa Provincial de Diabetes (Prodiaba), la detección de Diabetes tipo 2 en la mayoría de los sujetos asintomáticos sin diagnóstico, debe realizarse utilizando:

- a) Prueba de sobrecarga con glucosa oral (PTOG)
- b) Glucemia en ayunas
- c) Hemoglobina Glicosilada
- d) Prueba de detección oral (PDO)

12) Maria de G. es una paciente de 70 años a la que se le ha realizado una angioplastia con colocacion de stent coronario hace 5 dias. Usted es consultado por la paciente quien refiere haber extraviado las indicaciones farmacologicas del cirujano. Cual de los siguientes farmacos antiagregante le indicaria?:

- a) Heparina
- b) Aspirina
- c) Clopidogrel
- d) Aspirina + copidogrel

13) La infeccion vaginal por Candida Albicans presenta las siguientes características, excepto una. Marque la:

- a) Flujo blanco y espeso
- b) PH menor de 4,5
- c) Test de aminas positivo
- d) Respuesta inflamatoria positiva



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

14) En un paciente con diagnostico de cancer de prostata tratado con radioterapia usted desea seguir la evolucion pos terapeutica con:

- a) TAC abdominal y pelviana
- b) Ecografia abdominal y pelviana
- c) Centellografia osea
- d) Antigeno Serico Prostatico (PSA)

15) G. Berlinguer en su texto "Ética de la Salud", dice: "Hablar de equidad, pensando por un lado, en el valor intrínseco e irreplicable de cada persona y por el otro, a la importancia de:

- a) Medidas capaces de remover los obstaculos que se oponen al bienestar...
- b) Condiciones de valoracion economica de las comunidades occidentales hoy.
- c) Espacios de decision en la elaboracion de politicas sanitarias...

d) Criterios filosoficos que surgen a partir de las consecuencias sociales del siglo XIX

16) Teniendo en cuenta que el factor tubario es causa de esterilidad en un 14 a 22% de pacientes, indique la causa mas frecuente para producir obstruccion tubarica:

- a) Endometriosis
- b) Iatrogenia
- c) Enfermedad pelvica inflamatoria
- d) Alteraciones congenitas

17) Un paciente de 30 años, enfermero, con diagnostico de dispepsia, que se automedico con un bloqueante de los receptores H2 (ranitidina), un inhibidor de la bomba de protones (omeprazol), un prokinetico (cisapride) y antibioticos (β -lactamicos + metronidazol) ingresa a la Unidad Coronaria por una arritmia cardiaca grave. Cual de los farmacos que utilizo considera usted como responsable de su motivo de ingreso a la unidad Coronaria?:

- a) Ranitidina
- b) Omeprazol
- c) Cisapride
- d) Metronidazol



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

18) En el niño se denomina Síndrome Poliarticular a la afectación inflamatoria de:

- a) Dos articulaciones
- b) Tres articulaciones
- c) Cuatro articulaciones
- d) Cinco articulaciones

19) En un paciente que presenta alta sospecha de colecistitis aguda, el signo ultrasonografico que se busca para realizar el diagnostico es:

- a) Sombras acusticas (conos de sombra sonica)

- b) Hipodensidad y mayor grosor de la pared colecística (> 4 mm)
- c) Aumento del calibre de la V a Principal (> 10 mm)
- d) Vesícula con poco líquido en su interior (< 4 mm de diámetro transversal)

20) Todos estos cuadros son parte del síndrome metabólico excepto:

- a) Hipertrigliceridemia
- b) HDL baja
- c) Hipoglucemia
- d) Hipertensión arterial

21) Un paciente con cardiopatía estructural ha presentado varios episodios de fibrilación auricular. Indique el antiaritmico de elección para evitar las recurrencias:

- a) Amiodarona
- b) Propranolol
- c) Diltiazem
- d) Dioxina



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

22) Juana ser estudiada por esterilidad y es por ello que se le solicitan estudios hormonales para la evaluación de la reserva ovárica: FSH-E2. En que día del ciclo deber a realizarse dicho estudio?:

- a) En el día 3 del ciclo
- b) En el día 12 del ciclo
- c) Posterior al día 23 del ciclo
- d) En cualquier momento del ciclo

23) En la propuesta del Plan Federal de Salud 2004-2007 emitido por el Ministerio de Salud de la Nación y el consejo Federal de Salud (COFESA) se pondera a la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) como:

- a) Organizadora del sistema de salud
- b) Eje articulador de prevencion comunitaria
- c) Prioridad de acciones asistenciales
- d) Referencia descentralizada en el primer nivel de atencion

24) M. Rovere plantea que existen tres equidades detras del derecho a la salud: atencion, distribucion de riesgos y distribucion del saber y del poder. Segun el autor estas tres equidades configuran los/las:

- a) Caracteristicas accesorias del derecho a la salud
- b) Nociones de importancia relativa al derecho a la salud
- c) Rasgos basicos del derecho a la salud
- d) Lineamientos paralelos del derecho a la salud

25) Señale la afirmacion correcta referida a la transmision vertical del virus de la inmunodeficiencia humana:

- a) La cesarea electiva a las 38 semanas esta indicada de rutina
- b) La cesarea electiva a las 38 semanas esta indicada cuando la carga viral no ha sido realizada o la misma es superior a 1.000 copias
- c) La cesarea electiva a las 38 semanas esta indicada cuando la carga viral no ha sido realizada o la misma es superior a 10.000 copias
- d) La ruptura prematura de membranas ovulares mayor o igual a 2 horas de evolucion tiene un riesgo similar de transmision que el parto vaginal

26) En relacion a la aparicion y evolucion de los reflejos arcaicos del recién nacido segun se expresa en la guia para la Atencion Integral del Niño de 0 a 5 años, marque el enunciado correcto:

- a) El reflejo tonico cervical asimetrico suele aparecer desde el nacimiento y suele desaparecer a los 6 meses
- b) El reflejo de Moro suele aparecer desde el nacimiento y suele desaparecer a los 6 meses

- c) El reflejo de prension palmar suele aparecer desde los 4 meses y suele desaparecer a los 12 meses
- d) El reflejo de paracaídas suele aparecer desde el nacimiento y suele desaparecer a los 12 meses

27) En relación al principio de Justicia (Bioética), marque el enunciado correcto:

- a) Pretende que la actuación profesional sea beneficiosa para el paciente
- b) Exige tratar a todas las personas con la misma consideración, sin discriminación
- c) Conlleva el respeto a la libertad y responsabilidad del paciente
- d) Obliga a no hacer daño y a tratar al ser humano con atención y cuidado

28) En el municipio "La Esperanza" existe cierta preocupación acerca de la mortalidad infantil local. Es por ello que el Sr. intendente se reúne con usted y su equipo y les muestra cuáles son los datos sociodemográficos con los que cuenta correspondientes a ese año. Cual de las siguientes fórmulas utilizaría para construir la tasa de mortalidad infantil?:

- a) $(\text{total fallecidos menores de 0 a 14 años} / \text{población total de 0 a 14 años}) \times 1000 =$
- b) $(\text{total fallecidos menores de 1 año} / \text{población total de 0 a 1 años}) \times 1000 =$
- c) $(\text{total de fallecidos menores de 1 año} / \text{total de nacidos vivos al año}) \times 1000 =$
- d) $(\text{total de fallecidos menores de 0 a 4 años} / \text{población total de menores de 0 a 14 años}) \times 1000 =$

29) En el reumatismo poliarticular agudo, las válvulas más comúnmente afectadas son:

- a) Pulmonar y aórtica
- b) Tricúspide y pulmonar
- c) Mitrál y pulmonar
- d) Mitrál y aórtica

30) Según las Guías para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en un Primer Nivel de Atención (2004), un adulto padece Hipertensión Arterial cuando los promedios de dos o más mediciones de la PA, son iguales o superiores a 140 mmHg de sistólica y/o iguales o superiores a 90 mmHg de diastólica. Que período debe transcurrir entre las dos determinaciones?:

- a) 2 días
- b) 7 días
- c) 15 días
- d) 30 días

31) Un paciente de 67 años, durante la época de verano, se encuentra internado en un hospital general, con síntomas importantes de deshidratación. El médico que lo asiste constata que tiene alucinaciones visuales (ve personas, animales). A este tipo de alucinaciones, se las denomina:

- a) Asociadas
- b) Complejas
- c) Simples
- d) Complicadas



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

32) En la siguiente hipótesis: “El cumplimiento de las normas de bioseguridad en la asistencia, está condicionado a la capacitación y responsabilidad profesional”, marque la o las variables dependiente (s):

- a) Normas de bioseguridad
- b) Responsabilidad profesional
- c) Capacitación y responsabilidad profesional
- d) Cumplimiento de las normas de bioseguridad

33) La forma más frecuente de presentación de la deformidad de pie bot es:

- a) Pie talo valgo
- b) Pie varo equino congénito


- c) Metatarso varo
- d) Pie convexo o astragalo vertical

34) El diagnostico de Enfermedad de Chagas de transmision vertical en el lactante menor de 6 meses se confirma con:

- a) IgM especifica
- b) IgM especifica + M todo de Strout
- c) M todo de Strout
- d) IgM especifica + prueba de hemaglutinacion indirecta o prueba de aglutinacion directa para T. cruzi + prueba de inmunofluorescencia indirecta o ELISA para T. cruzi

35) En el Crup espasmodico la obstruccion maxima se encuentra:

- a) Por arriba de las cuerdas vocales
- b) Debajo de las cuerdas vocales
- c) En las cuerdas vocales
- d) Por arriba y por debajo de las cuerdas vocales



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

36) En el Marasmo es frecuente observar:

- a) Proteinas plasmaticas normales
- b) Hgado graso
- c) Edema
- d) Signos de avitaminosis

37) Un paciente que ingresa por guardia y al cual usted le hace diagnostico de acidosis metabolica aguda, es esperable que presente:

- a) Respiracion de Biot
- b) Respiracion de Kussmaul


- c) Tono ocular aumentado
- d) Piel humeda y fria

38) Segun la Guia para "El Cuidado Prenatal" (MSyA), en la mujer embarazada la deficiencia de acido folico es responsable de la produccion de anemia megaloblastica y puede traer efecto sobre el peso al nacer y defecto del tubo neural. Es por ello que usted recomendar a suplementar con acido folico oral:

- a) A todas las embarazadas desde el primer control prenatal
- b) A todas las embarazadas una vez cumplido el primer trimestre
- c) A todas las embarazadas desde el tercer trimestre
- d) Solo en los casos de anemia confirmada

39) En la Enfermedad Pelvica Inflamatoria oligosintomatica o silente, el microorganismo que con mayor frecuencia es responsable de lesiones anexiales graves es:

- a) Neisseria gonorrhoeae
- b) Chlamydia Trachomatis
- c) Complejo GAMM
- d) Anaerobios



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

40) Un paciente asmatico presenta en forma continua repetidos episodios de sibilancias, tos y disnea de variable intensidad. Usted ha realizado el diagnostico de asma persistente moderado. Indice beta 2 de accion corta (salbutamol) mas un corticoide inhalatorio (budesonide) con el que llegando a altas dosis no obtuvo mejor a. por tal razon usted indica:

- a) Agregar corticoides orales en forma continua
- b) Reemplazar budesonide por corticoides orales en forma continua
- c) Agregar beta 2 adrenergicos de accion prolongada
- d) Agregar beta 2 adrenergicos de accion prolongada + corticoides orales en forma continua

41) G. Berlinguer en su texto "Ética de la Salud", describe con respecto a la prioridad de la prevención, equívocos más bien banales. El segundo de ellos "esta en afirmar de palabra el valor práctico de la prevención..."?:

- a) Para alentar una propuesta sanitaria
- b) Pero negarlo en los hechos
- c) Pero invertir en capacidades tecnológicas
- d) Para extender recursos políticos

42) La administración de corticoides a la madre en la amenaza de pretermino, disminuye significativamente el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia endocraneana y la muerte neonatal. En que momento del embarazo deben ser administrados los mismos?:

- a) Entre las 22 y las 37 semanas
- b) Entre las 25 y las 30 semanas
- c) Entre las 28 y las 33 semanas
- d) Entre las 28 y las 39 semanas



43) Un paciente hipertenso de 65 años, diabético tipo 2, que presenta microalbuminuria, esta siendo tratado con dieta y enalapril (20 mg/día), lográndose un adecuado control de su tensión arterial. Presenta tos irritativa persistente que mejora al suspender el tratamiento farmacológico. Cual de los siguientes fármacos elegir a para reiniciar el tratamiento farmacológico?:

- a) Ramipril
- b) Atenolol
- c) Losartan
- d) Hidroclorotiazida

44) Las muestras de sangre para realizar el screening de hipotiroidismo congénito primario deben obtenerse:

- a) Dentro de las primeras 6 horas de vida

- b) Dentro de las primeras 12 horas de vida
- c) Dentro de las primeras 24 horas de vida
- d) Despues de las 48 horas de vida

45) Adrian S. ingresa por guardia presentando un cuadro de dolor abdominal precedido de una ingesta masiva de colecistoquineticos. Al examen de laboratorio presenta amilasemia elevada (3 veces la cifra maxima normal). Cual de los siguientes utilizaria preferentemente para la evaluacion de severidad lesional y pronostico?:

- a) Dosaje de calcio serico
- b) Criterios de Ranson
- c) Dosaje de lipasa serica y amilasa en orina
- d) Puncion abdominal y lavado

46) Un paciente de 45 años de edad, luego de superar una infeccion respiratoria presenta congestion y sensibilidad de la glandula tiroides que remite y recidiva alternadamente, ERS elevada y gammagrafia hipocaptante. Las posibilidades diagnosticas son:

- a) Adenoma tiroideo hiperfuncionante
- b) Tiroiditis De Quervain
- c) Tiroiditis cronica-bocio de Riedel
- d) Enfermedad de Hashimoto

Preguntas de Examen

47) Un paciente con diagnostico de insuficiencia ventricular izquierda estable, comienza a recibir tratamiento betabloqueante. Cual es el tiempo que espera para que se haga evidente una mejoria clinica?:

- a) 5 dias
- b) 15 dias
- c) 30 dias
- d) 60 dias

48) En relacion con el prolapso genital, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Marque la:

- a) Al desaparecer la accion estrogenica, los tejidos pierden su tono habitual y se favorece la relajacion pelviana
- b) Los ligamentos uteros sacros y cardinales constituyen el sistema de sosten
- c) El parto desempeña un papel importante en la genesis del prolapso genital
- d) La debilidad congenita de los ligamentos de suspension puede ser la causa del prolapso genital en las nuliparas

49) Un paciente con carga hereditaria de cancer colorrectal no ligado a poliposis deber realizarse una colonoscopia:

- a) Cada 4-5 años a partir de los 35-40 años
- b) Cada 1-3 años a partir de los 25-30 años
- c) Cada 6-8 años a partir de los 35-40 años
- d) Cada 4-5 años a partir de los 25-30 años



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

50) En la Declaracion Universal de Derechos Humanos el derecho a la salud esta consagrado de la siguiente forma:

- a) Como el derecho de toda persona al disfrute del m s alto nivel posible de salud fisica y mental
- b) Como un derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a la proteccion de su salud, seguridad e intereses economicos
- c) Como un derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar
- d) Como un estado de completo bienestar fisico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades

51) El tratamiento de eleccion de la embarazada con sifilis secundaria se realiza con penicilina G benzatinica 2.400.000 U por via intramuscular en:

- a) Dosis unica

- b) Dos dosis separadas por una semana de intervalo entre cada una
- c) Tres dosis separadas por una semana de intervalo entre cada una
- d) Cuatro dosis separadas por una semana de intervalo entre cada una

52) En una de las siguientes variantes histológicas benignas de los polipos del colon es mas probable que se encuentre un cancer al realizar su estudio histopatológico, luego de haberlo resecaado endoscópicamente:

- a) Adenoma hiperplásico
- b) Adenoma tubular
- c) Adenoma vellosa
- d) Adenoma tubulovelloso

53) En un niño, durante su primer año de vida, el promedio de la frecuencia cardíaca considerado como normal es de:

- a) 100 por minuto
- b) 115 por minuto
- c) 125 por minuto
- d) 135 por minuto



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

54) Juan de 38 años presenta hemorragia digestiva alta provocada por una úlcera gastroduodenal. Al realizarsele el estudio endoscópico, el mismo informa que el paciente presenta un coágulo adherido sobre la úlcera. Esto determina que el paciente tiene un riesgo de recidiva hemorrágica de:

- a) 2%
- b) 10%
- c) 35%
- d) 80%

55) En el síndrome de Cushing, la principal causa de diatesis hemorrágica es:

- a) funcionamiento plaquetario defectuoso
- b) fragilidad vascular
- c) defecto de factor de coagulación
- d) coagulación intravascular diseminada

56) Según el DSM IV los siguientes, excepto uno, son criterios para diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada. Marque:

- a) Preocupación excesiva
- b) Fatigabilidad
- c) Sensación de ahogo o falta de aliento
- d) Alteración del sueño

57) Ayelen S, de 6 años de edad concurre al Centro de Salud para realizar un examen previo al ingreso escolar. Al observar el esquema vacunal se aprecia que la niña presenta: BCG 1 dosis, Hepatitis B 3 dosis, Cuadruple 3 dosis, Sabin 4 dosis, triple viral 1 dosis. Usted considera que para completar el calendario según su edad se debe indicar una de las siguientes opciones:

- a) BCG + Sabin + Cuadruple + Triple viral
- b) BCG + Sabin + Triple Bacteriana + Doble viral
- c) BCG + Sabin + Triple Bacteriana + Triple viral
- d) BCG + Sabin + Doble Bacteriana + Triple viral

58) Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (mayo de 2000), "Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiados y sensibles a los requisitos de género y del ciclo de vida, y deben estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate". Con cuál de los siguientes criterios se puede evaluar el respeto a la salud?:

- a) Disponibilidad
- b) Accesibilidad

- c) Aceptabilidad
- d) Calidad

59) M Rovere plantea cinco niveles del proceso de construcción de una red en salud. El nivel donde la actividad se profundiza y se producen acuerdos o contratos que impliquen compartir recursos es:

- a) Colaboración
- b) Asociación
- c) Vinculación
- d) Confianza

60) La vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente está indicada en los inmunocompetentes e inmunocomprometidos que integran los grupos de alto riesgo para padecer infecciones invasivas por *Streptococcus pneumoniae* a partir de la edad de:

- a) 2 meses
- b) 12 meses
- c) 24 meses
- d) 96 meses



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

61) La droga de elección para el tratamiento de la otitis media aguda en pediatría es:

- a) Amoxicilina+ácido clavulánico
- b) Cefuroxima
- c) Cefotibuten
- d) Amoxicilina

62) La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda y de hipertensión arterial en lactantes es:

- a) Síndrome urémico hemolítico

- b) Reflujo vesicoureteral primario
- c) Reflujo vesicoureteral secundario
- d) Estenosis pieloureteral

63) Osvaldo M. concurre al centro de salud "La Primavera" para realizarse un control periodico de su glucemia dado que padece Diabetes 2 desde hace 5 años, por lo que esta medicado con metformina 1700 mg/dia. Se le solicita glucemia en ayunas y valores de Hemoglobina Glicosilada A1C (HbA1C) que arrojan los siguientes resultados: glucemia = 130; HbA1C = 7, por lo que usted considera que estos valores (segun las guias rapidas para el primer nivel de atencion del Programa provincial de diabetes-Prodiba-) se encuentran dentro de parametros:

- a) Normales
- b) Adecuados
- c) Admisibles
- d) Inadecuados

64) Hector de 45 años consulta a usted para realizarse un chequeo clinico. La tension arterial es de 150-95 mmHg, cifra que se repite en la segunda consulta. Es por ello que, siguiendo la Guia de Hipertension para el Primer Nivel de Atencion (MS Bs. As.), usted indica:

- a) Comenzar con tratamiento farmacologico y realizar control en 1 mes
- b) Comenzar con tratamiento farmacologico y realizar control en menos de 2 meses
- c) Comenzar con tratamiento farmacologico y realizar control en 1 año
- d) Comenzar con tratamiento no farmacologico y control en menos de 2 meses

65) Indique cual de los siguientes germen es el responsable de la gangrena uterina en el aborto septico:

- a) Pseudomona Aeruginosa
- b) Clostridium Perfringens
- c) Klebsiella spp.
- d) Actinomices israel

66) Llega un paciente a la guardia de emergencias que presenta nauseas, vomitos, deshidratacion y estado estuporoso. Confirma su sospecha clinica de cetoacidosis diabetica a pesar de no tener antecedentes. En su plan terapeutico incluye:

- a) Solucion salina mas insulina 1 U/k/dia
- b) Solucion salina mas insulina 1 U/k/hora
- c) Solucion salina mas insulina 0.1 U/k/dia
- d) Solucion salina mas insulina 0.1 U/k/hora

67) Para estudiar la asociacion entre una enfermedad con una prevalencia de 1 por 10000 habitantes y sus factores de riesgo recurrimos a:

- a) Estudio exploratorio
- b) Estudio de casos y controles
- c) Estudio de cohorte
- d) Estudio de corte transversal



Residencias Médicas
Preguntas de Examen

68) Ante un paciente adulto con cervicobraquialgia derecha y parestesias en dedo indice, disminucion de la fuerza del triceps y de los flexores de muñeca, a lo que se agrega disminucion del reflejo tricipital del lado derecho, la raiz comprometida es:

- a) C5
- b) C6
- c) C7
- d) C8

69) Dentro de los cuidados del recién nacido normal se establece que este debe recibir:

- a) Vitamina K intramuscular dentro de las primeras 6 horas de vida en dosis unica

- b) Vitamina K via oral dentro de las primeras 6 horas de vida en dosis unica
- c) Nitrato de plata al 1% solo en caso de presentar riesgo para oftalmia gonococcica
- d) Vacuna antihepatitis B luego del primer mes de vida

70) La conjuntivitis neonatal que se presenta despues de la primera semana de vida es producida por:

- a) Gonococo
- b) Treponema Pallidum
- c) Chlamydia
- d) Estreptococo Beta-Hemolitico B

1) A

2) C

3) A

4) D

5) A

6) B

7) D

8) B

9) D

10) B

11) B

12) D

13) C

14) D

15) A



- 16) C
- 17) C
- 18) D
- 19) B
- 20) C 21) A
- 22) A
- 23) A
- 24) C
- 25) B
- 26) B
- 27) B
- 28) C
- 29) D
- 30) B
- 31) B
- 32) D
- 33) B
- 34) C
- 35) C
- 36) A
- 37) B
- 38) A
- 39) B
- 40) C
- 41) B
- 42) C



43) C

44) D

45) B

46) C

47) C

48) B

49) B

50) C

51) C

52) C

53) D

54) C

55) B

56) C

57) C

58) C

59) B

60) C 61) D

62) A

63) C

64) D

65) B

66) D

67) B

68) C

69) A



70) C

